

Impfung	Zahl der Impfungen bei Grundimmunisierung und Alter bei Impfung	Zahl der Auffrischung im Kindesalter und Alter bei Auffrischimpfung (AI)	Auffrischung im Erwachsenenalter
Rotaviren	2 oder 3, je nach Impfstoff Ab 6. Woche und dann im Abstand von 4 Wochen	nein	nein
Tetanus	3 im Alter von 2,4, und 11 Monaten	2 1. AI im Alter von 5 bis 6 Jahren 2. AI im Alter von 9 bis 16 Jahren	Alle 10 Jahre
Diphtherie	3 im Alter von 2,4, und 11 Monaten	2 1. AI im Alter von 5 bis 6 Jahren 2. AI im Alter von 9 bis 16 Jahren	Alle 10 Jahre
Pertussis	3 im Alter von 2,4, und 11 Monaten	2 1. AI im Alter von 5 bis 6 Jahren 2. AI im Alter von 9 bis 16 Jahren	einmalig die erste fällige Tetanus-Diphtherie-Auffrischung einmalig in Kombination mit Pertussis (entspricht quasi 3. Pertussis- Auffrischung)
Hib	3 im Alter von 2,4, und 11 Monaten	nein	nein
Polio	3 im Alter von 2,4, und 11 Monaten	1 im Alter von 9 bis 16 Jahren	nicht standardmäßig, nur als Indikationsimpfung
Hepatitis B	3 im Alter von 2,4, und 11 Monaten	nein	nein
Pneumokokken	3 im Alter von 2,4, und 11 Monaten	nein	keine Auffrischung, sondern Standardimpfung ab 60 Jahren
Meningokokken C	1 im Alter von 12 Monaten	nein	nein
Masern	2 im Alter von 11 und 15 Monaten	nein	nein, aber einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen über 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
Mumps	2 im Alter von 11 und 15 Monaten	nein	nein
Röteln	2 im Alter von 11 und 15 Monaten	nein	nein
Varizellen	2 im Alter von 11 und 15 Monaten	nein	nein
HPV	2 bei Beginn im Alter von 9 bis 14 Jahren 3 bei Nachholimpfungen im Alter über 14 Jahren	nein	nein