

Kreuzen Sie bitte jeweils eine richtige Antwort an und übertragen Sie diese auf den Antwortbogen.

1. Bei einer laktogenen Infektion ...

- A. werden die Erreger schon im Mutterleib auf die Welpen übertragen.
- B. findet die Ansteckung durch die Haut statt.
- C. befinden sich die Erreger in der Milch des Muttertiers.

2. Katzen, die ausschließlich im Haus gehalten werden, ...

- A. müssen nicht entwurmt werden.
- B. können sich durch Wurmeier, die an den Schuhen kleben, anstecken.
- C. müssen nur entwurmt werden, wenn sie stark abmagern.

3. Der Fachbegriff für Bandwürmer ist ...

- A. Zestoden.
- B. Nematoden.
- C. Helminthen.

4. Rundwürmer ...

- A. bleiben stets auf den Darm beschränkt.
- B. heften sich mit ihrer Mundkapsel an die Darmwand an.
- C. nehmen ihre Nahrung über die gesamte Körperoberfläche auf.

5. Proglottiden sind die ...

- A. Kopfsegmente des Bandwurmes.
- B. Larven des Bandwurmes.
- C. sich ständig neu bildenden Glieder des Bandwurmes.

6. Wegen ihrer Widerstandsfähigkeit findet man auf öffentlichen Spielplätzen und in Sandkästen häufig ...

- A. Eier des Spulwurmes.
- B. Eier des Gurkenkernbandwurmes.
- C. Finnen des Schweinebandwurmes.

7. Spulwürmer ...

- A. sind für den Menschen nicht gefährlich.
- B. sind der Grund, weshalb bereits Welpen mehrfach entwurmt werden müssen.
- C. können aktiv durch die Haut in ihren Wirt gelangen.

8. Wenn einzelne Glieder des Gurkenkernbandwurmes den After des Hundes verlassen, ...

- A. ist dies nicht zu erkennen, denn sie sind mikroskopisch klein.
- B. verursacht dies starken Juckreiz.
- C. hat sich der Wurm aufgelöst und der Hund ist wurmfrei.

9. Der kleine Fuchsbandwurm ist ...

- A. für den Menschen sehr gefährlich, denn seine Larven nisten sich in der Leber ein und zerstören sie.
- B. für den Hund sehr gefährlich, da auch bei ihm die Leber zerstört wird.
- C. nur für Füchse lebensgefährlich.

10. Hunde und Katzen ...

- A. müssen nur entwurmt werden, wenn sie entsprechende Symptome zeigen.
- B. müssen nur als Welpen entwurmt werden, danach sind sie immun.
- C. sollten vier Mal im Jahr prophylaktisch ein Breitbandanthelminthikum gegen Rund- und Bandwürmer bekommen.